

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Дормикинд

Таблетки для рассасывания гомеопатические для детей.

Регистрационный номер:

Торговое название препарата:

Дормикинд

Лекарственная форма

Таблетки для рассасывания гомеопатические для детей

Состав

1 таблетка содержит:

активные вещества: Cypripedium parviflorum var. pubescens (Cypripedium pubescens) D4 15 мг, Magnesium carbonicum D10 20 мг, Zincum valerianicum D12 15 мг.

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 29,85 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 15 мг, тальк - 5 мг, магния стеарат - 0,15 мг.

Описание

Таблетки белого цвета плоскоцилиндрической формы, с фаской.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению

Применяется для лечения беспокойства и нарушений сна (трудности засыпания, беспокойный сон) у детей до 6 лет.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата; дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Лекарственный препарат не применяется у данной категории пациентов.

Способ применения и дозы

При отсутствии иных указаний Дормикинд следует принимать следующим образом:

Дети от 0 до 6 лет: по 1 таблетке 4 раза в день.

Таблетки принимают за полчаса до еды или через полчаса после еды, медленно рассасывая в полости рта. При лечении грудных детей и детей раннего возраста таблетки можно растворять в 5 мл (1 чайная ложка) воды. Максимальный курс лечения препаратом составляет 4 недели.

При отсутствии улучшения на фоне применения препарата в течение 14 дней или при появлении нежелательных явлений следует проконсультироваться с врачом.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции и реакции индивидуальной непереносимости. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не известны.

Если Ваш ребенок принимает или принимал в недавнем прошлом другие препараты, в том числе и те, которые можно приобрести без рецепта, то сообщите об этом Вашему врачу.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных препаратов может отмечаться временное обострение симптомов и в этом случае следует обратиться к врачу. При отсутствии терапевтического эффекта в течение 14 дней, а также появлении побочных эффектов, следует обратиться к врачу. Для пациентов, страдающих сахарным диабетом: содержание углеводов в максимальной суточной дозе препарата (4 таблетки) соответствует 0,026 хлебной единицы (ХЕ).

Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат применяется только у детей.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания гомеопатические для детей. По 150 таблеток во флаконе из коричневого стекла с пластмассовой завинчивающейся крышкой, с контролем первого вскрытия. 1 флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре от 15 до 25 °С, в сухом месте. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Предприятие-производитель

Дойче Хомеопати-Унион

ДХУ-Арцнаймиттель ГмБХ & Ко. КГ

Германия, 76227 Карлсруэ, Оттоштрассе, 24

Тел. +49 / 721 / 40 93 236

Представительство в РФ / Претензии потребителей направлять по адресу
ООО «Альпен Фарма», эксклюзивный представитель в России, 117513, Москва,
ул. Островитянова, д.6; тел. +7 (495) 609-65-72; эл. почта: info.russia@alpenpharma.com;
интернет-сайт: www.alpenpharma.ru.

Генеральный директор ООО «Альпен Фарма»

Зудин В.Б.

